

Nachsorgeplan - Kolorektales Karzinom

Die Nachsorge nach Operationen eines Dickdarmkrebses richtet sich nach dem Tumorstadium und nach individuellen Gesichtspunkten:

T 1 Karzinome (endoskopisch entfernt)

- Low risk = pT1, G1/2, L0, V0
- Kontrollkoloskopie nach 6, 24, 60 Monaten, danach alle 3 Jahre

- High risk = pT1, G3/4, L1, V1
- Radikale Operation, Kontrollkoloskopie nach 24 und 60 Monaten, danach alle 3 Jahre

Rektum- und Kolonkarzinom UICC Stadium I

- Koloskopie 24 und 60 Monate nach Operation, danach alle 3 Jahre
- Wenn präoperativ keine Koloskopie erfolgt war, muss diese 3 Monate postoperativ durchgeführt werden

Kolonkarzinom UICC Stadium II und III

| Untersuchung | Monat | | | | | | |
|----------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|
| | 6 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| CEA | 6 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| Sonographie | 6 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| Koloskopie | | | | 24 | | | 60 |
| Röntgen-Thorax | | 12 | | 24 | 36 | | 60 |
| CT-Abdomen | symptomorientiert | | | | | | |

Rektumkarzinom UICC Stadium II und III

| Untersuchung | Monat | | | | | | |
|----------------|--|----|----|----|----|----|----|
| | 6 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| CEA | 6 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| Sonographie | 6 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| Rektoskopie | 6 | 12 | 18 | | 36 | 48 | |
| Koloskopie | | | | 24 | | | 60 |
| Röntgen-Thorax | | 12 | | 24 | 36 | | 60 |
| CT-Abdomen | 3 Monate nach Abschluss der spezifischen Therapie (OP, Bestrahlung, Chemotherapie) | | | | | | |

Tumorstadien

| UICC | Dukes | T | N | M |
|----------|---------|------|------|----|
| UICC I | Dukes A | T1/2 | N0 | M0 |
| UICC II | Dukes B | T3/4 | N0 | M0 |
| UICC III | Dukes C | T1-4 | N1/2 | M0 |
| UICC IV | Dukes D | T1-4 | N0-2 | M1 |